



HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT

MDT Biochirurgie - Madentherapie

Kinisch 28 dagen

Decubituswond

Gebruik van een Biobag
Maden om de 3-4 dagen verwisseld



Start behandeling



Na 28 dagen



Start behandeling



Na 14 dagen

Kinisch 14 dagen

Hielwond

Gebruik van losse maden
Maden om de 3-4 dagen verwisseld



HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT

MDT Biochirurgie - Madentherapie

Kinisch 1 week

Patient

Man: 45 – 50 jaar

Teenamputatie dig II - ziekte van Reynaud.

Dig I in het verleden al geamputeerd.

Enkele dagen na OK ontstond er necrose in de wond.
De andere donkere plekken op de voet zijn oude hematomen.

1.
26-02 Wond voor aanvang MDT met Biobag

2.
29-03 Wond na 3 dagen MDT met Biobag en voor
aanvang MDT met losse maden

3.
29-02 Start MDT met losse maden

4.
03-03 Resultaat na eenmalige behandeling met losse
maden. Onder in de wond is geen necrose maar een
kleine hoeveelheid oud bloed.
Vervolgens verder behandeld met Chitoskin

